

Santé de l'enfant



L'Enquête Démographique et de Santé et à
Indicateurs Multiples (EDS-MICS II)
Comores 2012

- **Vaccination**

- Maladies des enfants


Enfants complètement vaccinés

Un enfant est considéré comme complètement vacciné lorsqu'il a reçu:

- Le BCG (protection contre la tuberculose)
- Le vaccin contre la rougeole
- 3 doses de DTCoq ou Pentavalent
- 3 doses de polio (non compris polio 0)


Couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois




Tendance de la couverture vaccinale

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins




Couverture vaccinale dans la sous-région

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés



Couverture vaccinale par île




Ngazidja
78 %

Comores
62 %



Mwali
(63 %)



Ndzuwani
50 %

*Pourcentage d'enfants de 12-23
mois complètement vaccinés*


Maoré
(non enquêtée)



Note : Les valeurs entre parenthèses sont basées sur 25-49 cas non pondérés.


Couverture vaccinale par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins



Couverture vaccinale par quintile de bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu tous les vaccins



- Vaccination
- **Maladies des enfants**


Infections Respiratoires Aiguës (IRA)

Dans les 2 semaines qui ont précédé l'enquête :
3 % des enfants de moins de cinq ans ont souffert de toux avec une respiration courte et rapide (des symptômes d'Infections Respiratoires Aiguës-IRA).

Pour 38 % de ces enfants, on a recherché un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé

IRA et la diarrhée selon l'âge des enfants

Pourcentage d'enfants moins de cinq ans qui ont souffert de l'une de ces maladies au cours des deux semaines ayant précédé l'enquête:



Traitement de la diarrhée

Dans les 2 semaines qui ont précédé l'enquête :


17 % des enfants de moins de cinq ans ont eu la diarrhée.

3 % des enfants ont eu la diarrhée avec sang.

Pour 40 % d'entre eux, on a recherché un traitement auprès d'un établissement ou d'un prestataire de santé.



Traitement de la diarrhée

Pourcentage d'enfants ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'enquête qui ont reçu:



*Sels de réhydratation orale

Pratiques alimentaires pendant la diarrhée



54 % des enfants diarrhéiques ont été traités avec une TRO et/ou ont reçu davantage de liquides et ont continué à être alimentés comme recommandé

Principaux résultats

- **62 %** des enfants de 12-23 mois ont été complètement vaccinés.
- Dans les deux semaines ayant précédé l'enquête, **3 %** des enfants ont eu des symptômes d'IRA ; un traitement a été recherché pour **38 %** des enfants malades.
- Dans les deux semaines ayant précédé l'enquête, **17 %** des enfants ont eu la diarrhée. **67 %** des enfants ont été traités avec une TRO et/ou ont reçu davantage de liquides. **16 %** n'ont reçu aucun traitement.